

# ប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយស៊ីស្ទ



សាស្ត្រចារ្យ កែវ មួយស្រួយ  
លោកស្រី អ៊ុង សីដា

# មូលហេតុរដ្ឋសមិទសៈជាប់

## ១. បង្កដោយមេរោគ

➤ មេរោគពីក្នុង:

ស្ត្រីមានសភាពប្រឈមក្លាយរោគ៖ ស្ត្រីមានគ្រុនក្តៅ បែកទឹក  
ភ្លោះយូរ.....

➤ មេរោគពីក្រៅ:

សម្ភារៈ ឧបករណ៍មិនបានសម្លាប់មេរោគត្រឹមត្រូវ  
កង្វះអនាម័យ ពិសេសការសម្អាតដៃមិនបានល្អ  
ឥរិយាបថប្រឈមក្លាយរោគរបស់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងបន្ទប់វះកាត់

# មូលហេតុរូបសមីនសះដាម

## ១. កត្តាប្រឈមក្នុងពេលវះកាត់

- ការប៉ះទង្គិច (Traumatism): វះយូរ ផ្គិតញឹក ស្លាបញឹក សង្កត់ រូបសឲ្យស្ងួតមុនដេរបិត
- Antiseptic: មុខរូបសមុនដេរបិត
- Espace mort : ដេរមិនជិត មានចំហរក្នុង ឬចំហរស្បែក
- Corps estranges : កំទេច ឬ កោសិកាស្លាប់នៅចន្លោះរូបស
- Necrose : ដេរស្ទះមិនអាចមានឈាមទៅចិញ្ចឹមកោសិកាម្តុំ ណាមួយនៃរូបស

# មូលហេតុរបួសមិនសះជាប់

## ៣. កិត្តាប្រឈមក្រោយវះកាត់

អ្នកថែទាំ

សម្ភារៈបរិក្ខារថែទាំមិនស្អាត បច្ចេកទេសថែទាំមិនត្រឹមត្រូវ

អ្នកជម្ងឺ

- ការប៉ះទង្គិច **ស្បៀកខោទឹកនោម** ស្បៀកសារុងចំលើមុខរបួស ធ្វើចលនាក្បាលពោះខ្លាំងពេក
- **យួមឲ្យបែកញើស** ប្រហែសឲ្យរបួសចំហរ ប្រឡាក់ប្រឡូសឬសើមដល់មុខរបួស
- ជម្ងឺប្រចាំកាយ: Diabète, Immuno-déprimé, Anémie....
- កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ: តមសាច់

## អង្គការសម្របសម្រួលក្នុងដោយវះកាត់ដើមឆ្នាំ ២០២៣

ល.រ	ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ	ចំនួនវះកាត់	ចំនួនវះកាត់%
១	មករា-មិថុនា	៤០៩៩/១៤៩៥	៣៦.៤%

ការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃ NMCHC



# អង្គការប្រួសមិនសះជាប់ក្រោយសម្រាលកូនដោយ វះកាត់នៅ NMCHC

ល.រ	ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំ	ចំនួនប្រួសមិនសះជាប់	ចំនួនប្រួសមិនសះជាប់%
១	មករា-មិថុនា	៤៧	៣.១%

ចំនួនជាក់ស្តែងនៅផ្នែកសម្បទានិងរោគស្ត្រី

# របៀបនៃការថែទាំរបួសក្រោយការសង្រ្គោះ ក្នុងដោយវះកាត់នៅ NMCHC ព័រមុន

ថ្ងៃទី២ = បើកបង់របួស លាងសម្អាត ជួរបង់ថ្នាំ

ថ្ងៃទី៤ = បើកបង់របួស លាងសម្អាត ជួរបង់ថ្នាំ

ថ្ងៃទី៦ = បើកបង់របួស លាងសម្អាត ជួរបង់ថ្នាំ

កាត់ថ្លៃរចន្លោះ

ថ្ងៃទី៧ = បើកបង់របួស លាងសម្អាត កាត់ថ្លៃអស់

ឬ ហូតថ្លៃ និងស្រ្តីត្រូវអនុញ្ញាតិឲ្យចេញ

ទៅផ្ទះបាន



# របៀបនៃការថែទាំរបួសក្រោយការសម្រាលកូន ដោយវះកាត់នៅ NMCHC ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

ថ្ងៃទី ៥ = បើកបង់របួស លាងសម្អាត ជួរបង់ថ្មី

ថ្ងៃទី ៧ = បើកបង់របួស លាងសម្អាត ជួរបង់ថ្មី

កាត់ថ្លេរចន្លោះ

ថ្ងៃទី ៨ = បើកបង់របួស លាងសម្អាត កាត់ថ្លេរអស់  
ឬ ហូតថ្លេរ និងស្រ្តីត្រូវអនុញ្ញាតិឲ្យចេញ  
ទៅផ្ទះបាន

គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រ MNCHC



## លាងរបួសមិនសះ ជាមហានខ្លះ

- Iodine 10 % ខាងក្រៅ
- NSS 0.9% ខាងក្នុង
- Eau Oxygene 3%  
ខាងក្នុង
- NSS 0.9% សម្អាត
- Metrolex 500mg/100ml  
ជាមួយកំប្រេស្ត
- ជួរបង់ថ្មី បិទរបួសវិញ

លាងរាល់ថ្ងៃរហូត  
ដល់អស់ខ្លះ



## លុះប្លូសចំហរ អត្រាខ្ពស់៖

- Iodine 10 % ខាងក្រៅ
- NSS 0.9% ខាងក្នុង
- ជួសបង់ថ្មី បិទប្លូសវិញ

ដេរបិទឡើងវិញ



## ការថែទាំបន្ត

1. អនាម័យបន្ទប់និងគ្រែគេងរបស់ស្រ្តី
2. ផ្តល់ការអប់រំឲ្យស្រ្តីជូតសម្អាតខ្លួនប្រាណ
3. អប់រំស្រ្តីឲ្យឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់
4. អប់រំស្រ្តីឲ្យញ៉ាំសាច់ឲ្យបានញឹកញាប់
5. លើកទឹកចិត្តឲ្យស្រ្តីធ្វើចលនាតិចៗដោយខ្លួនឯង
6. អប់រំឲ្យថែរក្សារបួសជៀសវាងការប៉ះកកិត
7. អប់រំស្រ្តីឲ្យបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ
8. ហាមស្លៀកខោទឹកនោម



# អរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់

