



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក
National Maternal and Child Health Center

ទិវាសល្យសាស្ត្រ សម្ព័ន្ធ និងរោគស្រ្តី លើកទី៣

ប្រធានបទ៖ «ពង្រឹង និងបង្កើនសេវាព្យាបាល ថែទាំ សង្គ្រោះ ប្រកបដោយគុណភាព»

ការលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះម្តាយសុទ្ធ



រៀបរៀង និងធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ លោកស្រី អ៊ុង លីដា ប្រធានគណៈកម្មការថែទាំ
នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក

ថ្ងៃទី៤-៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥
សណ្ឋាគារភ្នំពេញ

មាតិកា

១. អត្ថប្រយោជន៍នៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ
២. សកម្មភាពការលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ
ម្តាយនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក
៣. ភាពខ្លាំងនៃសកម្មភាពគាំទ្រ
៤. បញ្ហាប្រឈមនិងផលពិបាករបស់ក្រុមគាំទ្រ

**១. តើទឹកដោះម្តាយពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍
ចំពោះទារក (កូនបន្ទុស្ស) មែនដែរឬទេ**



On World Breastfeeding Week

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Catherine Russell និង Tedros Adhanom (នាយក WHO / UNICEF) បានថ្លែងថា៖

“ ក្នុងរយៈពេល ១២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ចំនួនទារកក្រោមអាយុ ៦ខែដែលបំបៅដោយទឹកដោះម្តាយសុទ្ធបានកើនឡើងច្រើន ជាង ១០% មានន័យថា ៤៨% នៃទារកនៅទូទាំងពិភពលោក សព្វថ្ងៃនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចាប់ផ្តើមជីវិតដែល មានសុខភាពល្អនេះ និងបង្ហាញថា៖

ទារករាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបាន សង្គ្រោះដោយការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ”

31 July 202 Geneva / New York

បន្ត....

WHO បានណែនាំឱ្យបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយ
មុខគត់រយៈពេល **៦ខែដំបូងនៃជីវិតរបស់ទារក** ព្រោះថា៖
“ ទឹកដោះម្តាយផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់គ្រប់មុខទាំង
អស់សម្រាប់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ល្អប្រសើរ”

“ ទឹកដោះម្តាយក៏ងាយរំលាយ និងមានអង្គបដិប្រាណ
ដែលការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺទូទៅជាច្រើនរបស់ទារក”

WHO, 2024

**តើអត្ថប្រយោជន៍អាហាររូបត្ថម្ភនៃការបំបៅ
កូនដោយទឹកដោះម្តាយចំពោះទារកមានអ្វីខុស៖**





តើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងពីការពិតនៃការចិញ្ចឹមកូនឬទេ ?

១. ជីវិតកុមារជាង ៨២០ ០០០នាក់ ត្រូវបានរក្សា (រស់) ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បើកុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុពី ០-២៣ខែ បានបំបៅដោយទឹកដោះម្តាយដែលល្អបំផុត។
២. ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវ IQ ការចូលសាលា និងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សពេញវ័យ។

WHO, 20 December 2023

បន្ត...

៣. កង្វះអាហារូបត្ថម្ភត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង ៤៥% នៃការស្លាប់របស់កុមារ

៤. ទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២២ មាន៖

- កុមារ ១៤៩លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានភាពក្រិន៖ក្រិន (ខ្លីពេកសម្រាប់អាយុ)
- កុមារ ៤៥លាននាក់ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានភាពក្រិន៖ក្រិន (ទាបពេកសម្រាប់កម្ពស់)
- កុមារ ៣៧លាននាក់ លើសទម្ងន់ឬធាត់ពេក

WHO, 20 December 2023

ការវិវឌ្ឍបទពិសោធន៍ស្ថានភាពលំបាកជាពិសេស

ការបំប្រែក្លាយដោយទឹកដោះម្តាយនៅតែជារបៀបនៃការផ្តល់អាហារដល់ទារកក្នុងស្ថានភាពលំបាកស្ទើរតែទាំងអស់ ។

ឧទាហរណ៍៖

១. ទារកទើបនឹងកើតទម្ងន់ទាបឬមិនគ្រប់ខែ
២. ម្តាយដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍
៣. ម្តាយវ័យជំទង់ (ក្មេង)
៤. ទារកនិងកុមារតូចដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
៥. គ្រួសារដែលទទួលបាននូវផលវិបាក

WHO, 20 December 2023

២. សកម្មភាពការលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះម្តាយនៅ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក

១. ការអប់រំសុខភាពអំឡុងពេល
ស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ


២. ការអប់រំសុខភាពមុនពេល
ចេញទៅផ្ទះ



**សកម្មភាពជួយស្ត្រីដាក់ទារកឱ្យស្បែកប៉ះស្បែក
ដើម្បីទារកតាមបានចោទដោះម្តាយក្រោយសម្រាល**




សកម្មភាពជួយស្ត្រីដាក់ទារកឲ្យស្បែកម៉ែស្បែក នៅក្នុងបន្ទប់ចុះកាត់




សកម្មភាពថែទាំទារកដោយទីកដោះម្តាយ នៅក្នុងបន្ទប់ថែទាំទារក




ទារកដែលបានដាក់ស្បែកប៉ះស្បែកនៅ OT



ទារកដែលបានបៅទឹកដោះម្តាយម៉ោងដំបូង



ការប្រៀបធៀបអំពីការគាំទ្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយសុទ្ធ (គិតជា%)



ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយសម្រាប់ទារកដែលកើតពី ម្តាយមានមេរោគ អេដស៍ រលាកថ្លើមប្រភេទបេ និងស្វាយ

- ភ្លាមៗក្រោយពេលសម្រាលម្តាយត្រូវតែទទួលបានការប្រឹក្សា
យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជម្រើសនៃការចិញ្ចឹមទារក
ដើម្បីចាប់ផ្តើមអនុវត្តវិធីចិញ្ចឹមខណៈពេលដែលស្ត្រីកំពុងស្ថិត
នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយ
- ទោះបីមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការចម្លងពីម្តាយទៅកូននៃមេរោគ
អេដស៍ក្នុងអំឡុងពេលបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយក៏ដោយ
ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នៃការចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះគោដែលមិនត្រឹមត្រូវ
ឬការបំបៅលាយគ្នាគឺមានទំហំធំជាង

គោលការណ៍ណែនាំជាតិសម្រាប់ការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ ស្វាយ និងរលាកថ្លើមប្រភេទបេ ពីម្តាយទៅកូន ទំព័រ៧៣

បន្ត....

- ចំពោះម្តាយវិជ្ជមានលោកថ្លើមប្រភេទបេ មិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថា៖

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយបង្កើនហានិភ័យនៃការចម្លង
ពីម្តាយទៅកូននូវមេរោគលោកថ្លើមប្រភេទបេនោះទេ

ដូច្នេះ៖

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់ត្រូវបាន
គាំទ្រលើកទឹកចិត្ត

គោលការណ៍នាំជាតិសម្រាប់ការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ ស្វាយ និងលោកថ្លើមប្រភេទបេ ពីម្តាយទៅកូន ទំព័រ៧៣

បន្ត...

- ចំពោះម្តាយវិជ្ជមានមេរោគស្វាយ មិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីការឆ្លងមេរោគស្វាយតាមរយៈទឹកដោះម្តាយទេ ដូច្នេះ

សូម្បីតែម្តាយដែលទើបតែចាប់ផ្តើមការព្យាបាលជម្ងឺស្វាយ ក៏គួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ របស់គាត់ដែរ

គោលការណ៍នាំជាតិសម្រាប់ការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ ស្វាយ និងលោកឆ្លើមប្រភេទបេ ពីម្តាយទៅកូន ទំព័រ៧៣

បញ្ហាប្រឈម

១. កត្តាស្ត្រី (សុខភាពនិងការងារ)
២. កត្តាគ្រួសារ (ខ្វះការគាំទ្រពីគ្រួសារ)
៣. កត្តាសង្គម (បរិយាកាសជុំវិញដូចជា៖ ការ
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម មិត្តភក្តិ.....)
៤. កត្តាអ្នកផ្តល់សេវា (ចំនួនសម្រាលច្រើន អ្នក
ផ្តល់សេវាខ្វះមិនសូវចូលរួម)

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់

